TRATAMIENTO MATACARCOMAS MADERAS INTERIORES PLUS



Ideal sobre todo tipo de muebles sanos o infectados, en el interior del hogar.

USO

- Para todos todo tipo de maderas
- Ideal para muebles encerados, barnizados...

NO DAÑA LA MADERA
NO MANCHA

Herramientas: Pincel

Tiempo de secado: Entre 2 capas 1H
Secado completo 48H

Rendimiento:

Madera sana: 5m2/L

Madera atacada: 3m2/L

Limpieza : AGUA

CARACTERÍSTICAS

Tratamiento preventivo de maderas de clase de uso (CU)1. Uso interior para maderas blandas y duras. Tratamiento curativo de madera en uso (interior). Público en general. Personal profesional.
Preventivo: Aplicación superficial por brocheo. Dosis de aplicación sin diluir: 200 ml /m² de madera.
Curativo : Aplicación superficial por brocheo. Dosis de aplicación sin diluir: 300 ml /m² de madera.
Inyección (combinado con una aplicación superficial) : Dosis de aplicación: 150 ml / m² de madera (+ 300 ml / m² de madera para su aplicación superficial).
Nº registro españa : ES/BB(NA)-2018-08-00566
Nueva generación de tratamiento que ACTÚA INMEDIATAMENTE contra los insectos e IMPIDE su reaparición al permanecer activo dentro de la madera.
Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas, tales como lictus, carcomas y TERMITAS.
No estropea las maderas antiguas. No mancha la madera. Acción preventiva y curativa.
Compatible con todos los acabados V33 : protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes...
Hylotrupes bajulus - Carcoma grande o polilla de la madera. Anobium punctatum Escarabajo del mueble. Lyctus brunneus - Escarabajo pulverizador de la madera. Reticulitermes sp.Termitas. Coptotermes sp Termita subterráneas asiáticas. Heterotermes sp.Termitas subterráneas.

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.
Madera barnizada o pintada : Decape con el Decapante Especial Madera V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas. Lije y elimine el polvo.
Madera encerada : Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.
Madera con protector : Lije para dejar la madera sin protector.

APLICACIÓN

1 – Si la madera está infectada, elimine las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y refuerce o sustituya las partes demasiado dañadas.
2 – Aplicar el producto sin diluir en abundencia en 3 capas (2 si es madera sana) sobre todo el mueble, incluso debajo de los pies y el interior del mueble.
3 – Temperaturas ideales de aplicación: entre 12 y 25°C. Plazo de seguridad recomendado 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto.

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso.

V33 España, C/ Colquide, 6 - Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E 28231 Las Rozas de Madrid
Tlf. + 34 916370382 - www.v33.es

TRATAMIENTO MATACARCOMAS MADERAS INTERIORES PLUS



Ideal sobre todo tipo de muebles sanos o infectados, en el interior del hogar.

PRECAUCIONES



PELIGRO - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene Hidrocarburos C10-C13. Contiene ‘’permetrina’’. Puede provocar una reacción alérgica. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Guardar bajo llave. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente. TP08 - Protectores para maderas. Los tratamientos curativos aplicados mediante inyección deben combinarse siempre con tratamientos curativos realizados mediante aplicación superficial. Composición : Permetrina (N°CAS 52645-53-1) 0.70%. Hidrocarburos >95%. Otros líquidos AL (cualquier otro líquido). Antes de usar el producto, léase la etiqueta o las instrucciones de uso y sigua todas las indicaciones dadas. Los usuarios deben informar directamente al titular de la autorización si el tratamiento no es eficaz. No aplicar en madera que probablemente vaya a estar en contacto con alimentos, piensos, bebidas y ganado. Evitar el contacto con la piel. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son : Dermatitis, irritación de ojos, nariz y garganta. Náuseas, vómitos, vértigo, cefalea y parestesias bucales. Reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo. Neumonía por aspiración y depresión del SNC. Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Tratamiento sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. Teléfono 91 562 04 20. No tirar el producto en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe. Envases vacíos, restos de producto, y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente. Vida útil: 50 meses. ATENCIÓN: este producto puede generar vapores que pueden inflamarse fácilmente en medio encerrado y en presencia de chispas o de cualquier fuente de inflamaciones.

UFI: KD21-Q0VN-Y00T-G3GF

V33 España, C/ Colquide, 6 - Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E 28231 Las Rozas de Madrid
Tlf. + 34 916370382 - www.v33.es